



Démence et Syndrome de Down

Il est largement admis que les personnes atteintes du _____ sont plus susceptibles que la population générale de développer la maladie d'Alzheimer en _____.

- Le diagnostic peut être problématique dans cette population pour plusieurs raisons:
 - la grande _____ intra-individuelle quant au fonctionnement _____,
 - les différentes procédures _____ et _____ utilisées dans le domaine et
 - la difficulté à obtenir _____ concernant le fonctionnement cognitif qui aideront à évaluer les changements cognitifs et comportementaux.
- D'une manière générale, il n'y a pas de _____ précis pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
- La maladie d'Alzheimer est diagnostiquée par un processus d' _____. L'historique _____ complet est pris et un _____ médical est effectué.
- Le stade précoce d'Alzheimer passe souvent inaperçu avec le Syndrome de Down parce que:
 - des _____ anciens ont tendance à réapparaître
 - le personnel a tendance à mettre l'accent sur les comportements plutôt que sur la _____ de ces comportements
 - il peut être difficile d'obtenir l'historique _____ et
 - d'autant plus difficile d'obtenir des renseignements _____ des personnes qui ont un niveau de fonctionnement cognitif réduit
- Les problèmes médicaux peuvent se manifester en termes de _____. Les examens couramment employés pour le diagnostic d'Alzheimer ne tiennent pas compte des _____ existantes.

Diagnostic éclipsant

Le problème médical qui se présente est attribué à la _____ de la personne

OU

Le problème médical qui se présente est attribué à l' _____ de la personne
ALORS QUE LE PROBLEME MEDICAL EST SOUVENT LIEE AUX DEUX FACTEURS